



#HidupSehat
#Alodokter

Begini Jadwal Pemberian Vaksin PCV pada Bayi Sesuai Rekomendasi IDAI





Begini Jadwal Pemberian Vaksin PCV pada Bayi Sesuai Rekomendasi IDAI



Vaksin PCV diberikan pada umur 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan, dengan pemberian booster pada umur 12-15 bulan.¹



Jika belum vaksin PCV pada umur 7–12 bulan, berikan PCV 2 kali dengan jarak minimal 1 bulan dan booster setelah umur 12 bulan dengan jarak sedikitnya 2 bulan dari dosis sebelumnya.¹



Jika belum pernah diberikan pada umur 1–2 tahun, berikan PCV 2 kali dengan jarak 2 bulan.¹



Jika belum pernah diberikan pada umur 2–5 tahun, silakan mengacu pada rekomendasi IDAI atau konsultasikan dengan dokter spesialis anak terlebih dahulu.¹



#HidupSehat
#Alodokter

Fakta Penting Terkait Vaksin PCV untuk Bayi & Anak-anak →





#HidupSehat
#Alodokter

Fakta Penting Terkait Vaksin PCV untuk Bayi & Anak-anak



Vaksin PCV merupakan vaksin yang dapat mencegah infeksi akibat bakteri pneumokokus.¹



Kondisi yang disebabkan bisa berupa pneumonia, meningitis, hingga bakteremia.²



Risiko infeksi bakteri pneumokokus pada bayi & anak-anak sangatlah serius.³



Berdasarkan rekomendasi IDAI 2020, vaksin PCV termasuk vaksin program yang perlu diberikan pada bayi.⁴

1. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Vaccination. <https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/pneumo/index.html>. Last access on May 20, 2021
2. Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI. (2017). Pedoman Imunisasi Pada Orang Dewasa 2017. Interna Publishing Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam. Pg. 157-165
3. Mayo Clinic. Symptoms & Causes – Pneumonia. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pneumonia/symptoms-causes/syc-20354204>. Last access on May 20, 2021
4. Soedjatmiko, et al. Jadwal imunisasi anak umur 0-18 tahun Rekomendasi IDAI tahun 2020. Sari Pediatri 2020; 22(4): 252-60